

Recomendaciones para el uso de antibióticos profilácticos en la atención segura del aborto

Para la aspiración endouterina y el procedimiento de dilatación y evacuación

Antes del procedimiento, una dosis única de:

- 200 mg de doxiciclina por vía oral o
- 500 mg de azitromicina por vía oral o
- 500 mg de metronidazol por vía oral

Para el aborto con medicamentos

No se recomienda el uso de antibióticos profilácticos de rutina.

Las mujeres con alto riesgo deben someterse al tamizaje de infecciones de transmisión sexual. A las mujeres que presentan signos y síntomas de infección se les debe proporcionar servicios de aborto sin demora y el tratamiento de antibióticos correspondiente de conformidad con los regímenes basados en evidencia. Las parejas de mujeres con infección de transmisión sexual también necesitan tratamiento.

Referencia: Ipas (2019). Actualizaciones clínicas en salud reproductiva. Chapel Hill, Carolina del Norte: Ipas.
© 2018, 2019 Ipas

f x i y gob.mx/salud/cnegssr



Gobierno de
México

Salud
Secretaría de Salud

CNEGSSR
Centro Nacional de Equidad de
Género, Salud Sexual y Reproductiva



SSA
SECRETARÍA
DE SALUD

SESA
SERVICIOS ESTATALES
DE SALUD